

INFORMATIVA GESTIONE DEI PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONE AVVERSA A MEZZO DI CONTRASTO


(Rif. Documento di consenso SIRM – SIAAIC Aprile 2018)

Sono identificati come **pazienti a rischio di reazione avversa al mezzo di contrasto** i pazienti con:

- Pregressa reazione allergica o simil-allergica a seguito di indagine con la medesima classe di MDC da utilizzare
- Presenza di asma bronchiale o orticaria-angioedema non controllati dalla terapia farmacologica
- Mastocitosi
- Pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodio/i di anafilassi in cui non è riconoscibile la causa scatenante)

L'allergia a molluschi, crostacei, pesci o altri alimenti non è da considerarsi un fattore di rischio per reazioni da ipersensibilità al MdC. Anche l'allergia ad altre categorie di farmaci non è da considerarsi un fattore di rischio.

Un'anamnesi positiva per reazioni da ipersensibilità ad antisettici iodati non costituisce un fattore di rischio.



* In paziente con anamnesi positiva per multiple allergie o allergia singola con gravi manifestazioni cliniche (shock, edema della glottide, broncospasmo, etc.) si consiglia l'esecuzione in ambiente ospedaliero.